

शिमला मिरची (ढोबळी मिरची) उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

● Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
● 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119
● connect@dhanwantari.com ● www.dhanwantari.com

जमिनीची मशागत

5 किलो RPS 76 दाणेदार+
2 बॅग गोरीच प्रोम प्रति एकर
इतर खतांबरोबर एकत्र करून द्यावे.




रोप लावण्याआधी

एका बॅरलमध्ये 100 ml RPS 76+
100 ml सॉइल गार्ड 25 ते 30 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून घ्यावे व रोप
लावण्या आधी प्रत्येक ट्रे या मध्ये
बुडवून घ्यावा.



रोप लावल्यानंतर लगेच

3 बॉक्स traporich
प्रति एकर
लावून घ्यावेत.



रोप लावल्यानंतर 8 ते 10 दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 1 लीटर +
बॅक्टोरिच किट 200 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा आळवणीद्वारे देणे.



रोप लावल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 500 ml +
सॉइलगार्ड 500 ml 200 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा ड्रीपद्वारे देणे.



रोप लावल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 3 ml+
Sproutrich 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



5 % फूलधारणा झाल्यानंतर

फ्लोराचि 1ml+
RPS 76 लिक्वीड 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

इमोनोरिच अल्ट्रा 2ml +
RPS 76 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



रसशोषणाच्या किडींचा प्रादुर्भाव झाल्यास

क्रॉपगार्ड 5ml प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे
दुधा सोबत किंवा ताकासोबत फवारणी करावी.
(200 लीटर पाण्यासाठी 250 ml दूध किंवा ताक.)



बुरशीजन्य / जीवाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास.

माइकोरिच 1 ग्रॅम / प्लांट गार्ड
1 ग्रॅम प्रति लीटर पाणी
याप्रमाणे फवारणी करावी.



1 ते 2 तोडे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा 5 लीटर प्रति एकर
200 लीटर पाण्यामध्ये मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रीप ने देणे.



भेंडी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS 76 दाणेदार +
२ बॅग गोरिच प्रोम प्रति एकर इतर
खतांबरोबर एकत्र करून द्यावे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



बियाणे लावल्यानंतर ८ ते १० दिवसांनी

बॅक्टीोरिच (फ्रूट अँड व्हेजीटेबल)
मधील सर्व जीवाणू १० मि.ली. +
RPS76 २५० मि.ली. १०० लीटर पाण्यात
एकत्र करून रोपांना आळवणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

क्रॉपगार्ड ५ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे दुधा सोबत किंवा
ताकासोबत फवारणी करावी.
(२०० लीटर पाण्यासाठी २५० मि.ली. दूध किंवा ताक.)



पुर्नलागवड नंतर लगेच

३ बॉक्स ट्रॅपोरिच
प्रति एकर लावून घ्यावेत.



रोप लावल्यानंतर २० ते ३० दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा ड्रिपद्वारे देणे.



५% फूलधारणा झाल्यानंतर

फ्लोरारिच १ मि.ली. +
RPS 76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



१ ते २ तोडे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रिप ने देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

निशीगंध उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS 76 दाणेदार +
२ बॅग गोरीच प्रोम प्रति एकर इतर
खतांबरोबर एकत्र करून घ्यावे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



कंद लावण्याआधी

एका बॅरलमध्ये RPS 76 १०० मि.ली. +
१०० मि.ली. Soil Guard
२५ ते ३० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून घ्यावे
व कंद लावण्या आधी प्रत्येक कंद
या मध्ये बुडवून घ्यावा.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

क्रॉपगार्ड ५ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे दुधा सोबत किंवा
ताकासोबत फवारणी करावी.
(२०० लीटर पाण्यासाठी २५० मि.ली. दूध किंवा ताक.)



कंद लावल्यानंतर लगेच

RPS 76 लिक्विड ५०० मि .ली
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रिपद्वारे देणे.
+ ट्रॅप ३ बॉक्स एकरी लावावेत.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रती लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



रोप लावल्यानंतर ३५ ते ४० दिवसांनी

बॅक्टोरिच (फ्रूट अँड व्हेजीटेबल)
मधील सर्व जीवाणू १० मि .ली +
RPS76 ५०० मि.ली २०० लीटर पाण्यात
एकत्र करून पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



१ ते २ तोडे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रिप ने देणे.



प्रत्येक २ महिन्यांनंतर गोरस अल्ट्रा
पाटपाण्याने घ्यावे.

५% फुलधारणा झाल्यानंतर

फ्लोरारिच १ मि.ली.+
RPS 76 लिक्विड २ मि.ली.
प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.
१० दिवसांनी परत फवारणी करावी.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

इंद्र उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमीन तयार करताना

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
गोरिच प्रोम २ बॅग + शिफारस केलेली
खताची मात्रा प्रति एकर देणे.



४० ते ५० दिवसानंतर

मायकोरिच १ ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून
फवारणी किंवा आळवणी करणे.



रोपे नर्सरीमधून आणल्यानंतर

RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली.
या प्रमाणे रोपांवर फवारणी करून
नंतरच लागवड करावी.



२ ते ३ तोड्यानंतर

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
ड्रिपिंग करणे.



रोपे लावल्यानंतर ३ ते ४ दिवसांनी

एकरी ३ बॉक्स
ट्रॅपोरिच लावावे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



२० ते २१ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यात मिसळून ड्रिप किंवा
पाटपाण्याने देणे.



बुरशीजन्य/जीवाणूजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड
किंवा
१ ग्रॅम मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



फुटव्यांच्या अवस्थेमध्ये

स्प्राऊटरिच ३ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

भात उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. +
२५० मि.ली. बीजोरिच (सिलिस्)
एक एकर साठी लागणाऱ्या बियाण्यास
हलक्या हाताने चोळावे व सावलीमध्ये सुकवून
पेरणीसाठी उपयोग करावा.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलिकोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



उगवण झाल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड १ मि.ली. +
सिलिकोरिच १० ग्रॅम
प्रती लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्राॅपगार्ड/
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. /
सिलिकोरिच १० ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



रोपाची लागण करताना

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. +
बीजोरिच २५० मि.ली. ५० ते ६० लीटर
पाण्यात मिसळावे व त्यामध्ये भाताच्या
रोपांची मुळे बुडवून मग लागण करावी.




बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



रोपांची लागवड झाल्यानंतर लगेचच

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

गहू उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



पेरणीनंतर ५० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यात एकत्र करून
पाटपाण्याने देणे.



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. +
२५० मि.ली. बीजोरीच एक एकर साठी
लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे
व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.




प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरीच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्वोरीच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरीच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



उगवण झाल्यानंतर २ ते ३ दिवसांनी

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रेप) लावून घ्यावेत.



रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्राॅपगार्ड /
RPS इम्युनोरीच अल्ट्रा २ मि.ली. /
सिल्वोरीच १० ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



पेरणीनंतर २० ते ३० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
गोर्स अल्ट्रा २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने देणे.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास



१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरीच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



पेरणीनंतर ३० ते ४५ दिवसांनी

अधिक जोमदार फुटव्यांसाठी
स्प्राऊटरीच ५०० मि.ली. १५० लीटर पाण्यामध्ये
एकत्र करून फवारणी करावी.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

सीताफळ उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



मे-जून महिन्यात

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
सेंद्रीय खतात मिसळून देणे.




बुरशीजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

मायकोरिच १ ग्रॅम / प्लांटगार्ड १ ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करावी.



बाग फुटण्यास सुरुवात झाल्यानंतर

३ बॉक्स ट्रॅपोरिच
प्रति एकर लावून घेणे.



दुसरे पाणी देताना

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
+ बॅक्टोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात एकत्र करून
पाट पाण्याने देणे.



सुपारीच्या आकाराची फळे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा पाच लीटर आणि
RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
प्रति एकर २०० लीटर पाण्यात एकत्र
करून पाट पाण्याने सोडावे.



डिसेंबर - जानेवारी महिन्यामध्ये

१०० किलो गोरिच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये
एकत्र करून देणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

क्रॉपगार्ड ५ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी
करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

केळी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरिच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र
करून देणे.




घड निघण्याच्या अवस्थेमध्ये

गोरस अल्ट्रा ५ लिटर + २०० लिटर
पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.
(पाणी देणे शक्य नसल्यास फवारणी करणे.)



रोप लावल्यानंतर लगेच

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलकोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
एकत्र करून फवारणी करणे.



रोप लावल्यानंतर ८ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
ड्रिपने देणे .



रोप लावल्यानंतर १५ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
मायकोरिच ४०० ग्रॅम प्रति एकर
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



केळीची बांधणी करताना

८० किलो गोरिच प्रोम प्रति एकर
इतर खतांसोबत एकत्र करून देणे.
RPS-७६ लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच कीट २०० लीटर
पाण्यात मिसळून ड्रिपने देणे .



रस शोषक किडींचा प्रार्दुभाव झाल्यास

५ मि.ली. क्रॉपगार्ड
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचा प्रार्दुभाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड प्रति लीटर
पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.
मायकोरिच ४०० ग्रॅम प्रति एकर २०० लीटर
पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे. किंवा ड्रिपमधुन देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com

तंबाखू उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड ३० मि.ली.
साँडलगार्ड २० मि.ली. घेऊन
प्रति किलो बियाण्यास चोळावे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलकोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



जमिन तयार करताना

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये
एकत्र करून देणे.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्राॅपगार्ड
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



पुर्नलागवड केल्यानंतर लगेचच

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स (३० ट्रेप)
लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रार्दुभाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात
मिसळून फवारणी करणे.



पुर्नलागवड केल्यानंतर ३ ते ४ दिवसांनंतर

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यामध्ये
एकत्र करून आळवणी करणे.



पुर्नलागवड केल्यानंतर ५० दिवसांनी

गोरस अल्ट्रा पाच लीटर
प्रति एकर २०० लीटर
पाण्यामध्ये एकत्र करून
पाटपाण्याने सोडावे.



पुनर्लागवड केल्यानंतर १० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड
३ मि.ली. प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com



DHANWANTARI
DISTRIBUTORS PVT LTD

ऊस उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



ऊस लागवडीच्या वेळी

बेसल डोस

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
८० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



६ महिन्या नंतर

गोरस अल्ट्रा २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.

हा डोस प्रत्येक २ महिन्यांनंतर तोडणीपर्यंत द्यावा.



बेणेप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
+ बॅक्टोरिच कीट
१०० लीटर पाण्यात मिसळून बेणे १० मिनीटे बडवून ठेवणे व नंतर
लागवडीसाठी घेणे. राहीलेले मिश्रण सरीमध्ये सोडून देणे.



बुरशीजन्य रोगांचा प्रार्दुभाव झाल्यास

मायकोरिच ४०० ग्रॅम
किंवा सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
प्रति एकर २०० लीटर
पाण्यात मिसळून ट्रॅचिंग करणे.
किंवा ड्रिपमधुन देणे.



२ महिने नंतर (बाळ बांधणी)

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



हुमणीचा प्रार्दुभाव झाल्यास

नेमारिच १ किलो प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
ट्रॅचिंग करणे. किंवा ड्रिपमधुन देणे.



जोमदार फुटव्यांसाठी

स्पाऊटरिच ५०० मि.ली.
१५० लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी घेणे.



पाचट कुजवण्यासाठी

कंपोस्टरिच १५० ग्रॅम प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाचटावर फवारणी करावी.



४ महिने नंतर (मोठी बांधणी)

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर
+ बॅक्टोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने सोडणे.



तसेच बांधणी करताना
८० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
इतर खतांबरोबर देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

वाटाणा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिन तयार करताना

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये
एकत्र करुन देणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलकोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करुन फवारणी करणे.



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली.
(ऑइलसीड अँड पल्सेस) +
२५० मि.ली. बीजोरिच एक एकरसाठी
लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे
व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.




रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्राॅपगार्ड
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



उगवण झाल्यानंतर २ ते ३ दिवसांनी

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात
मिसळून फवारणी करणे.



पेरणीनंतर २० ते ३० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉइलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने देणे.



दाणे भरण्याच्या अवस्थेत

गोरस अल्ट्रा पाच लिटर
प्रति एकर २०० लीटर
पाण्यामध्ये एकत्र करुन
पाटपाण्याने सोडावे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

तुर उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलकोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. +
२५० मि.ली. बीजोरिच एक एकरसाठी
लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे
व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.




अळी आणि रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्राॅपगार्ड /
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. /
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



उगवणीनंतर २ ते ३ दिवसांनी

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात
मिसळून फवारणी करणे.



पेरणीनंतर २० ते ३० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यात एकत्र करून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



दाणे भरतेवेळी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
गोरस अल्ट्रा २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



फूलधारणा सुरु झाल्यानंतर



RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. + फ्लोरारिच १ मि.ली. +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली.प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.

DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com

मिरची उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

• Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
• 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
• Agri Care : 83800 10119
• connect@dhanwantari.com • www.dhanwantari.com

जमिनीची मशागत

5 किलो RPS 76 दाणेदार+
2 बॅग गोरीच प्रोम प्रति एकर
इतर खतांबरोबर एकत्र करून द्यावे.




रोप लावण्याआधी

एका बॅरलमध्ये 100 ml RPS 76+
100 ml सॉइल गार्ड 25 ते 30 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून घ्यावे व रोप
लावण्या आधी प्रत्येक ट्रे या मध्ये
बुडवून घ्यावा.



रोप लावल्यानंतर लगेच

3 बॉक्स traporich
प्रति एकर
लावून घ्यावेत.



रोप लावल्यानंतर 8 ते 10 दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 1 लीटर +
बॅक्टोरिच किट 200 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा आळवणीद्वारे देणे.



रोप लावल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 500 ml +
सॉइलगार्ड 500 ml 200 लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा ड्रीपद्वारे देणे.



रोप लावल्यानंतर २० ते २५ दिवसांनी

RPS 76 लिक्वीड 3 ml+
Sproutrich 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



5 % फूलधारणा झाल्यानंतर

फ्लोराचि 1ml+
RPS 76 लिक्वीड 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

इमोनोरिच अल्ट्रा 2ml +
RPS 76 3 ml प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



रसशोषणाच्या किडींचा प्रादुर्भाव झाल्यास

क्रॉपगार्ड 5ml प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे
दुधा सोबत किंवा ताकासोबत फवारणी करावी.
(200 लीटर पाण्यासाठी 250 ml दूध किंवा ताक.)



बुरशीजन्य / जीवाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास.

माइकोरिच 1 ग्रॅम / प्लांट गार्ड
1 ग्रॅम प्रति लीटर पाणी
याप्रमाणे फवारणी करावी.



1 ते 2 तोडे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा 5 लीटर प्रति एकर
200 लीटर पाण्यामध्ये मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रीप ने देणे.





DHANWANTARI
DISTRIBUTORS PVT LTD

टोमॅटो उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



रोप नर्सरीमधून आणल्यानंतर

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा १ मि.ली. +
RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. +
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



रोप लावल्यानंतर २ ते ३ दिवसांनी

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



रोप लावल्यानंतर दुसऱ्या पाण्यासोबत

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली.
+ बॅक्टोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून ड्रिपिंग करणे.



फुटव्यांच्या अवस्थेमध्ये

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



स्प्राऊटरिच ३ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात घेऊन फवारणी करावी.

प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



फूलधारणा पूर्ण झाल्यानंतर

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
फ्लोरायच १ मि.ली. +
१ ग्रॅम प्लांट गार्ड
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून
फवारणी करणे.



अळी आणि रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्रॉपगार्ड
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. /
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



बुरशीजन्य / करपा रोग प्रारंभ झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड /
मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



फुलांचे फळामध्ये रुपांतर होताना

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- 📧 connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com

चांगल्या परिणामांकरिता प्रत्येक फवारणीमध्ये स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणीसाठी घ्यावे.

द्राक्ष उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



सॅद्रिय खते देताना

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
सॅद्रिय खतात मिसळून देणे.



एप्रिल छाटणीनंतर पहिले पाणी देताना

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
+ बॅक्टीरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.



ऑक्टोबर छाटणी नंतर

गोरिच प्रोम २०० किलो
प्रति एकर देणे.



ऑक्टोबर छाटणीनंतर पहिले पाणी देताना

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
+ बॅक्टीरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.



५% फुलधारणा झाल्यानंतर

३ बाॅक्स ट्रॅपोरिच प्रति एकर लावून घ्यावेत.
फ्लोराइच १ मि.ली. +
इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
RPS76 लिक्वीड ३ मि.ली.
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र
करून फवारणी करणे.



फळधारणा पूर्ण झाल्यानंतर

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
१ ग्रॅम PLANT GUARD प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर +
२०० लीटर पाण्यात मिसळून
ड्रेंचिंग करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी या प्रमाणे फवारणी करणे.



जीवाणूजन्य / बुरशीजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

MYCORICH १ ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून
फवारणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींचा प्रारंभ झाल्यास

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा ३ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com

डाळींब उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



बेसल डोस

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
२०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
४ ते ५ टन शेणखतामध्ये एकत्र करुन देणे.



पहिल्या पाण्यासोबत

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
१ बॅक्टोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यात मिसळून देणे.



फळामध्ये रंग बदल होत असताना

१ बॅक्टोरिच कीट +
गोरस अल्ट्रा ५ लीटर प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यात मिसळून देणे.



२० दिवसानंतर

RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
मिसळून फवारणी करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करुन
फवारणी करणे.



५% फूलधारणा झाल्यानंतर

३ बॉक्स ट्रॅपोरिच प्रति एकर लावून घ्यावेत.
फ्लोरायड १ मि.ली. +
इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
आरपीएस लिक्वीड ३ मि.ली.
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र
करुन फवारणी करणे.



बुरशीजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

MYCORICH १ ग्रॅम प्रति
प्रतिलीटर पाण्यात एकत्र करुन
फवारणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींचा प्रारंभ झाल्यास

इम्युनोरिच अल्ट्रा ३ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करुन
फवारणी करणे.



फळधारणा पुर्ण झाल्यानंतर

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
MYCORICH १ ग्रॅम
प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करुन
फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com 🌐 www.dhanwantari.com

कांदा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



रोपवाटीका तयार करताना

बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड ३० मि.ली.
+ बॅक्टेरिच कीट
(प्रत्येक बॅक्टेरिया १० मि.ली.)
घेऊन प्रति किलो घेऊन
बियाण्यास चोळावे.)



८ ते १५ दिवसानंतर

RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. +
सिल्वोरिच ५ ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
मिसळून फवारणी करावी.





जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
८० किलो गोरिच प्रोम,
प्रति एकर देणे.



पुनर्लागवड नंतर लगेचच

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



पुनर्लागवड केल्यानंतर ८ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्वोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
एकत्र करून फवारणी करणे.



पुनर्लागवड केल्यानंतर १० दिवसांनी

फ्रुट अँड व्हेजीटेबल बॅक्टेरिच कीट १,
RPS-76 लिक्वीड १ लीटर
प्रति एकर पाण्यातून देणे.



पुनर्लागवड केल्यानंतर ४५ दिवसांनी

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर +
RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी घेणे.



कांद्यावर येणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. क्रॉप गार्ड /
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. /
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



बुरशीजन्य / करपा रोगाचा प्रारंभ झाल्यास



१ ग्रॅम प्लांट गार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



कांदा काढण्यापूर्वी

५०० मि.ली. सॉईलगार्ड +
गोरस स्लरी ५ लीटर एकत्र करून
२०० लीटर पाण्यातून सोडणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

प्रत्येक फवारणीमध्ये स्टिकाकोरिच ०.४ मि.ली. प्रति लीटर
सोबत वापरल्यास परिणाम अधिक प्रभावशाली मिळतील.

बटाटा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
८० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करुन देणे.



फूलधारण सुरु झाल्यानंतर



RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. + फ्लोरारिच १ मि.ली. +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करुन फवारणी करणे.



बेणेप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
+ बॅक्टोरिच कीट
१०० लीटर पाण्यात मिसळून बेणे १० मिनीटे बडवुन ठेवणे व नंतर
लागवडीसाठी घेणे. राहीलेले मिश्रण सरीमध्ये सोडून देणे.




फळधारणा सुरु झाल्यानंतर

५०० मि.ली. सॉईलगार्ड +
गोरस स्लरी ५ लीटर एकत्र करुन
२०० लीटर पाण्यातून सोडणे.



उगवणीनंतर २ ते ३ दिवसात

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रेप) लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य/जीवाणूजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास



१ ग्रॅम प्लांट गार्ड प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.
MYCORICH ४०० ग्रॅम प्रति एकर २०० लीटर पाण्यात मिसळून
ड्रिपिंग करणे. किंवा ड्रिपमधुन देणे.

प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.+
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
एकत्र करुन फवारणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींचा प्रारंभ झाल्यास

५ मि.ली. क्राॅप गार्ड +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली.
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119
📧 connect@dhanwantari.com 🌐 www.dhanwantari.com

अद्रक उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१२० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



अद्रकला भर घालताना

८० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर देणे.



बेणेप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टीोरिच कीट
१०० लीटर पाण्यात मिसळून बेणे १० मिनीटे बुडवून ठेवणे व नंतर
लागवडीसाठी घेणे. राहीलेले मिश्रण सरीमध्ये सोडून देणे.



लागवडीनंतर १० ते १०० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टीोरिच कीट
२०० लीटर पाण्यातून देणे.



लागवडीनंतर १५ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
२०० लीटर पाण्यामध्ये एकत्र करून देणे किंवा
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



लागवडीनंतर १२० दिवसांनी

गोरस अल्ट्रा २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



रस शोषणाच्या किडींचा प्रार्दुभाव झाल्यास

५ मि.ली. क्रॉप गार्ड +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली.
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



कंदकुज किंवा बुरशीजन्य रोगांचा प्रार्दुभाव झाल्यास

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
मायकोरिच ४०० ग्रॅम
प्रति एकर २०० लीटर पाण्यात
पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.
किंवा ड्रिपमधुन देणे.



लागवडीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनी

गोरस अल्ट्रा २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

हळद उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमीन तयार करताना

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
८० किलो गोरिच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.
(डी.ए.पी./एस.एस.पी. टाकू नये.)



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.+
सिल्वोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात
एकत्र करून फवारणी करणे.



बेणेप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
मायकोरिच २०० ग्रॅम +
१०० लीटर पाण्यात मिसळून बेणे १० मिनीटे बुडवून ठेवणे व नंतर
लागवडीसाठी घेणे. राहिलेले मिश्रण सरीमध्ये सोडून देणे.





लागवडीनंतर ५० ते ६० दिवसांनी

गोरस अल्ट्रा २०० प्रति लीटर
पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



उगवणीनंतर लगेच

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



खताची भर देताना

८० किलो गोरिच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये
एकत्र करून देणे.



लागवडीनंतर पहिले पाणी देताना

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच कीट +
२०० लीटर पाण्यातून
आळवणी करणे.



लागवडीनंतर ११० ते १२० दिवसांनंतर

RPS-76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच कीट २०० लीटर
पाण्यातून आळवणी करणे.



कंदकुज किंवा बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
मायकोरिच ४०० ग्रॅम
प्रति एकर २०० लीटर पाण्यात
पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.
किंवा ड्रिपमधुन देणे.



लागवडीनंतर २१ ते २५ दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
प्रति एकर २०० लीटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपमधुन देणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com

सोयाबीन उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत



एकरी ५ किलो RPS-76 दाणेदार + शिफारस केलेल्या रासायनिक खतांची मात्रा + २ ते ३ टन शेणखतामध्ये, ४० ते ८० किलो गोरीच प्रोम एकत्र करून देणे.

सोयाबीन बीजप्रक्रिया



RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. + २५० मि.ली. बीजोरीच एक एकर साठी लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.

उगवण झाल्यानंतर २ ते ३ दिवसांत

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स (३० ट्रॅप) लावून घ्यावेत.



पेरणीनंतर प्रत्येक अमावस्येला

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. + RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



३० दिवसानंतर

RPS-76 ५०० मि.ली. + गोरेस अल्ट्रा ५ लीटर + ५०० मि.ली. साईलगाई २०० लीटर पाण्यात एकत्र करून सोडणे.



५% फूलधारण झाल्यानंतर



RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. + फ्लोराच १ मि.ली. + स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



सोयाबीन वर येणारे रोग



१ ग्रॅम प्लॉटगार्ड / मायकोरिच प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



सोयाबीन वरती येणाऱ्या किडी



५ मि.ली. क्रॉपगार्ड RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. / १० ग्रॅम सिल्कोरिच प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant, Satara - 415 002, Maharashtra, India.
☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119
📧 connect@dhanwantari.com 🌐 www.dhanwantari.com

कपाशी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत



एकरी ५ किलो RPS-76 दाणेदार + शिफारस केलेल्या रासायनिक खतांची मात्रा + २ ते ३ टन शेणखतामध्ये, ४० ते ८० किलो गोरिच प्रोम एकत्र करून देणे.


कपाशी बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. + २५० मि.ली. बीजोरिच एक एकर साठी लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.



उगवणीनंतर ३ ते ४ दिवसांत

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स (३० ट्रेप) लावून घ्यावेत.



उगवणीनंतर प्रत्येक अमावस्येला

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. + RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



३० दिवसानंतर

RPS-76 ५०० मि.ली. + गोरस अल्ट्रा ५ लीटर + ५०० मि.ली. सॉईलगार्ड २०० लीटर पाण्यात एकत्र करून सोडणे.



फूलधारणा सुरु झाल्यानंतर



RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. + फ्लोरारिच १ मि.ली. + स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



कपाशी वर येणारे रोग



१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



कपाशी वर येणाऱ्या कीडी



५ मि.ली. क्राॅपगार्ड / RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. / १० ग्रॅम सिलिकोरिच प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant, Satara - 415 002, Maharashtra, India.
☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com 🌐 www.dhanwantari.com



चना उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS-76 दाणेदार ,
१०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
२ ते ३ टन शेणखतामध्ये एकत्र करुन देणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिलकोरिच १० ग्रॅम प्रति लिटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मी.ली. प्रति लिटर
पाण्यात एकत्र करुन फवारणी करणे.



बीजप्रक्रिया

RPS-76 लिक्वीड २५० मि.ली. +
RPS-76 लिक्वीड १०० मि.ली. +
२५० मि.ली. बीजोरिच एक एकर साठी
लागणाऱ्या बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे
व सावलीमध्ये सुकवून पेरणीसाठी उपयोग करावा.




अळी आणि रस शोषणाऱ्या किडींसाठी

५ मि.ली. Crop Guard /
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. /
प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



उगवण झालेनंतर २ ते ३ दिवसात

एका एकर मध्ये ३ बॉक्स
(३० ट्रेप) लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य / करपा रोग प्रारंभ झाल्यास



१ ग्रॅम PLANT GUARD / MYCORICH
प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



पेरणीनंतर २०-३० दिवसांनी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
सॉईलगार्ड ५०० मि.ली.
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



दाणे भरतेवेळी

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली.
गोरस अल्ट्रा २०० लिटर पाण्यात मिसळून
पाटपाण्याने किंवा ड्रिपने देणे.



फुलधारणा सुरु झाल्यानंतर



RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. +
फ्लोरा रिच १ मि.ली. + स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली.
प्रति लिटर पाण्यात एकत्र करुन फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

आंबा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



पावसाळ्यात (जून-जुलै)

१० किलो RPS-76 दाणेदार ,
२०० किलो गोरीच प्रोम प्रति एकर
४ ते ५ टन शेणखतामध्ये एकत्र करून देणे.



कळीचे फळामध्ये रुपांतर झालेनंतर

पाहिला स्प्रे झाल्यावर
१५ दिवसानंतर हाच स्प्रे पुन्हा घेणे.

५ मि.ली. Crop Guard + ५ मि.ली. दुध प्रति लिटर
पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.



८ ते १५ दिवसानंतर

RPS-76 लिक्वीड ५०० मि.ली. +
+ बॅक्टोरिच कीट
२०० लिटर पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे.



फळामध्ये रुपांतर झालेनंतर

१५ दिवसानंतर

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.+ सिल्कोरिच १० ग्रॅम
RPS-76 लिक्वीड २ मि.ली. + फ्लोरोरिच १ मि.ली. +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली.प्रति लिटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



एक महिन्यानंतर

गोरस अल्ट्रा ५ लिटर + २०० लिटर पाण्यात मिसळून
ड्रेंचिंग करणे.



पालवी येण्यास सुरुवात झालेनंतर (ऑक्टो-नोव्हें)

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.+
सिल्कोरिच १० ग्रॅम
प्रतिलिटर पाण्यात
एकत्र करून फवारणी करणे.
तसेच ५ ट्रॅपोरिच लावणे.



बुरशीजन्य रोगांचा प्रारंभ झाल्यास

१ ग्रॅम PLANT GUARD प्रति लिटर
पाण्यात मिसळून फवारणी करणे.
MYCORICH ४०० ग्रॅम प्रति एकर
पाण्यात मिसळून ड्रेंचिंग करणे. किंवा ट्रिपमधुन देणे.
(पाणी देणे शक्य नसल्यास मायकोरिच २०० ग्रॅम २०० लिटर पाण्यात
एकत्र करून फवारणी करणे.)



फळे लहान असताना

गोरस अल्ट्रा ५ लिटर + २०० लिटर पाण्यात मिसळून
ड्रेंचिंग करणे.
(पाणी देणे शक्य नसल्यास फवारणी करणे.)



मोहोर येण्यास सुरुवात झालेनंतर

RPS-76 लिक्वीड ३ मि.ली. +
फ्लोरोरिच १ मि.ली. +
RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
MYCORICH ४०० ग्रॅम प्रति एकर
प्रतिलिटर पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com 🌐 www.dhanwantari.com

काँफी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS 76 दाणेदार +
२ बॅग गोरिच प्रोम प्रति एकर इतर
खतांबरोबर एकत्र करून द्यावे.



फुलोरा अवस्थेमध्ये

फ्लोराच १ मि.ली.+
RPS 76 लिक्वीड ३ मि.ली.+
प्रति लीटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



बीजप्रक्रिया

बॅक्टोरिच (फ्रूट अँड व्हेजीटेबल)
मधील सर्व जीवाणू १० मि.ली. +
RPS 76 ५० मि.ली. एकत्र करून
१० किलो बियाण्यास हलक्या हाताने चोळावे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली.+
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



रोपे १५ दिवसांची झाल्यानंतर

बॅक्टोरिच (फ्रूट अँड व्हेजीटेबल)
मधील सर्व जीवाणू १० मि.ली. +
RPS 76 २५० मि.ली. १०० लीटर पाण्यात
एकत्र करून रोपांना आळवणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

क्रॉपगार्ड ५ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे दुधा सोबत किंवा
ताकासोबत फवारणी करावी.
(२०० लीटर पाण्यासाठी २५० मि.ली. दूध किंवा ताक.)



पुर्नलागवड नंतर लगेच

३ बॉक्स ट्रॅपोरिच
प्रति एकर लावून घ्यावेत.



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रति लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



पुर्नलागवड नंतर फुटवे अवस्था

RPS 76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच किट २०० लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा आळवणीव्दारे देणे.



मुळकुज झाल्यास

सॉईलगार्ड ५०० मि.ली. २०० लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने किंवा ड्रीपव्दारे देणे.



स्प्राऊटरिच ३ मि.ली.+
RPS 76 लिक्वीड ३ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.

☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007

Agri Care : 83800 10119

📧 connect@dhanwantari.com

🌐 www.dhanwantari.com

चहा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान



जमिनीची मशागत

५ किलो RPS 76 दाणेदार +
२ बॅग गोरिच प्रोम प्रति एकर इतर
खतांबरोबर एकत्र करून द्यावे.



रोपे १५ दिवसांची झाल्यानंतर

बॅक्टोरिच (फ्रूट अँड व्हेजीटेबल)
मधील सर्व जीवाणू १० मि.ली +
RPS 76 २५० मि.ली १०० लीटर
पाण्यात एकत्र करून रोपांना आळवणी करणे.



पुर्नलागवड करण्याआधी १ दिवस

इम्युनोरिच अल्ट्रा १ मि.ली. +
RPS 76 १ मि.ली प्रति लीटर पाणी
याप्रमाणे फवारणी करणे.



पुर्नलागवड नंतर लगेच

३ बॉक्स ट्रॅपोरिच
प्रति एकर लावून घ्यावेत.



पुर्नलागवड नंतर फुटवे अवस्था

RPS 76 लिक्वीड १ लीटर +
बॅक्टोरिच किट २०० लीटर
पाण्यामध्ये मिसळून पाट पाण्याने
किंवा आळवणीव्दारे देणे.



स्प्राऊटरिच ३ मि.ली. +
RPS76 लिक्वीड ३ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे फवारणी करणे.



प्रत्येक अमावस्येला

RPS इम्युनोरिच अल्ट्रा २ मि.ली. +
सिल्कोरिच १० ग्रॅम प्रति लीटर +
स्टिकोरिच ०.२५ मि.ली. प्रति लीटर
पाण्यात एकत्र करून फवारणी करणे.



रस शोषणाच्या किडींसाठी

क्रॉपगार्ड ५ मि.ली. प्रति लीटर
पाणी याप्रमाणे दुधा सोबत किंवा
ताकासोबत फवारणी करावी.
(२०० लीटर पाण्यासाठी २५० मि.ली. दूध किंवा ताक.)



बुरशीजन्य /जीवाणूजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास

१ ग्रॅम प्लांटगार्ड / मायकोरिच
प्रती लीटर पाण्यात मिसळून
फवारणी करणे.



१ ते २ तोडे झाल्यानंतर

गोरस अल्ट्रा ५ लीटर प्रति एकर
२०० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून
पाट पाण्याने किंवा ड्रीप ने देणे.



प्रत्येक २ महिन्यांनंतर गोरस अल्ट्रा
पाटपाण्याने द्यावे.

DHANWANTARI DISTRIBUTORS PVT. LTD.

- 📍 Eshita Heights, Near Bombay Restaurant,
Satara - 415 002, Maharashtra, India.
- ☎ 02162 - 298216 / 17 / 18 / 19 Toll Free : 18002330007
- 📞 Agri Care : 83800 10119
- ✉ connect@dhanwantari.com
- 🌐 www.dhanwantari.com